
Screening pentru prevenirea cancerului de col uterin



Cancerul de col uterin este cauzat de o infecție cu virusul papiloma uman (HPV): un virus foarte frecvent în populație care se transmite în principal pe cale sexuală. Acest tip de cancer este primul recunoscut de OMS ca fiind în totalitate atribuit unei infecții.

În cele mai multe cazuri, infecția este tranzitorie și asimptomatică, în timp ce în cazurile în care infecția persistă și progresează, se pot dezvolta diferite manifestări patologice ale pielii și mucoaselor, în funcție de tipul de HPV implicat. De fapt, până în prezent, au fost identificate peste 100 de tipuri de HPV, dintre care aproximativ 40 au fost asociate cu boli ale tractului anogenital, atât benigne, cât și maligne. Diferitele tipuri de HPV au fost împărțite în viruși cu risc "ridicat" și "scăzut" de evoluție neoplazică. În plus, Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului (IARC) a confirmat dovezi oncogene pentru 12 tipuri de HPV. Unele tipuri au o tendință mai mare de a progresa în tumori decât altele. Se estimează că HPV 16 și 18 sunt responsabile pentru mai mult de 70% din cazurile de acest cancer. Tipurile de HPV cu risc scăzut sunt asociate cu leziuni benigne, cum ar fi negii genitali.

Virusul se transmite sexual, prin contactul cu pielea sau mucoasele. Transmiterea prin contacte genitale nepenetrative este posibilă, astfel încât utilizarea prezervativelor, deși reduce riscul de infecție, nu îl elimină complet, deoarece virusul poate infecta și pielea care nu este protejată de prezervative.

Programul de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin face posibilă detectarea precoce a infecției cu HPV, identificând și orice leziuni precanceroase care, dacă nu sunt tratate, ar putea progresa și se pot dezvolta în cancer.

Cum se efectuează testul de screening

Testul implică o colectare simplă și rapidă a unei probe de celule din colul uterin de către o moașă; Proba colectată va fi apoi depozitată într-o soluție lichidă și ulterior analizată și raportată de personal medical calificat.

Testul permite identificarea afecțiunilor care predispun la apariția cancerului de col uterin.

Când să o faci

Se adresează femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani și are următoarea distincție de ofertă:

- pentru femeile cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani, există un test Papanicolau de trei ani și cu care se urmărește prezența anumitor modificări celulare care preced dezvoltarea unei tumori;
- pentru femeile cu vârste cuprinse între 30 și 64 de ani, pe de altă parte, este furnizat testul HPV cu un rapel de cinci ani și cu care se urmărește prezența materialului genetic al virusului Papilloma.

Femeile vaccinate pentru virusul papiloma până la vârsta de 15 ani sunt chemate la testul de screening direct cu testul HPV la vârsta de 30 de ani, care se repetă la fiecare 5 ani și până la vârsta de 64 de ani. Motivul pentru care această categorie de femei este numită de la vârsta de 30 de ani (în loc de 25 de ani) provine din rezultatul pe care îl arată cercetările științifice, și anume un risc foarte scăzut de a dezvolta cancer de col uterin înainte de vârsta de 30 de ani, dacă sunt vaccinate cu 2 doze până la vârsta de 15 ani. De fapt, leziunile precanceroase rare relevante pentru sănătate care pot fi găsite regresează spontan sau progresează foarte lent, oferind timp pentru a le identifica și trata chiar și începând screeningul la vârsta de 30 de ani.

Cum să vă alăturați

Femeile cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani primesc o scrisoare de invitație acasă cu o programare programată pentru a susține testul de screening în clinica de referință pentru zona lor de reședință.

În caz de imposibilitate de a vă prezenta în ziua și ora indicate sau dacă doriți să schimbați locul, puteți apela NUMĂRUL GRATUIT



activ de luni până vineri de la 9.00 la 13.00, sau profitați de un cod QR special pentru a schimba programarea.

Ce ar trebui să fac dacă nu primesc invitația

Dacă nu primiți scrisoarea noastră de invitație, puteți contacta NUMĂRUL GRATUIT



activ de luni până vineri între orele 9.00 și 13.00.

Dacă testul este negativ

Dacă testul este negativ, veți primi o scrisoare de rezultat la domiciliu și veți fi reinvitat după 3 ani, dacă aveți între 25 și 29 de ani, sau reinvitat după 5 ani, dacă aveți între 30 și 64 de ani.

Dacă testul este inadecvat

În cazuri rare, se poate întâmpla ca testul să fie inadecvat, din cauza oricărei inflamații care necesită terapie înainte de efectuarea testului sau din cauza unui număr inadecvat de celule colectate pentru o analiză corectă a probei biologice. În aceste condiții, femeia primește acasă o scrisoare prin care se informează despre inadecvarea probei biologice care urmează să fie analizată și, în același timp, o nouă programare pentru repetarea testului.

Dacă testul este pozitiv

Dacă testul este pozitiv, se efectuează o colposcopie, adică un examen de evaluare efectuat de un ginecolog și care permite obținerea unei vederi mărite a suprafeței colului uterin și în timpul căreia, numai dacă este necesar, se efectuează și probe mici de țesut, numite biopsii.

Dacă testul HPV este pozitiv, nu se efectuează direct o colposcopie, ci un test Papanicolau pentru a verifica dacă prezența virusului a dus deja la o modificare a celulelor colului uterin; acest ultim studiu aprofundat nu necesită acces suplimentar din partea femeii, deoarece se folosește același material biologic folosit pentru primul test HPV analizat. În cazul în care testul Papanicolau este negativ, femeia este contactată din nou pentru a efectua testul HPV după un an în loc de 5 ani.

Colposcopia este gratuită și se rezervă la una dintre clinicile ginecologice afiliate. Procesul de diagnostic aprofundat se poate încheia cu un rezultat liniștitor pentru femeie care apoi revine la apelurile obișnuite de screening citologic, printr-o scrisoare de invitație trimisă la domiciliu. În unele cazuri, însă, pentru o anumită perioadă de timp, sunt necesare trasee personalizate, întotdeauna gratuite, cu verificări atente, răspunzând la recente Orientări ale Regiunii Lombardia, înainte de a reveni la procesul de selecție de rutină cu invitația la fiecare 3 ani sau 5 ani.

Când nu este indicat efectuarea testului de screening

- Femei care nu au avut niciodată relații sexuale;
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală anterioară pentru îndepărtarea uterului pentru patologie benignă sau malignă;
- Femeile care au avut deja cancer de col uterin și nu sunt hysterectomizate și sunt supuse controalelor de cancer programate;
- Femeile care au efectuat deja, în afara programului de screening, un test Papanicolau (în ultimii 3 ani) sau un test HPV (în ultimii 5 ani) cu rezultat negativ.

Vaccinarea împotriva HPV

Vaccinarea poate preveni leziunile genitale precanceroase ale colului uterin, vulvei și vaginului, inclusiv tipurile 16 și 18, care sunt recunoscute ca fiind cele mai responsabile pentru leziunile precanceroase.

În Italia, vaccinarea HPV este recomandată și oferită gratuit fetelor și băieților cu vârsta de 11 ani și este administrată în două doze la interval de 6 luni. Dacă ciclul de vaccinare începe după vârsta de 15 ani, există trei doze.

Vaccinurile HPV utilizate astăzi protejează împotriva celor mai periculoase 9 serotipuri HPV și sunt extrem de sigure și eficiente: pot preveni mai mult de 90% din cancerele asociate HPV și au fost administrate în siguranță la milioane de fete și băieți din întreaga lume.

Pentru mai multe informații despre vaccinare:

[ASST Pavia](#)